

C

1. Személyes adatok

Név:.....	Ország:
TAJ szám:.....	Város:
Születési dátum:.....	Intézmény:
Beavatkozás dátuma:.....	Beavatkozást végző szakorvos:

2. Intracoronáriás nyomásmérés

(Ha több mint egy lézió készült mérés vagy egynél több mérés készült ugyanazon a lézióon kérem töltsön ki egy újabb C Formot)

Klinikai állapot (egyszerű választás): O elektív O STEMI O NSTEMI O instabil angina pectoris O Egyéb:.....

Behatolási kapu: O femoralis O radialis
O Egyéb:.....

Nyomásmérés helye (egyszerű választás):

O LM O LAD O CX O RCA O Diagonális O Graft O Egyéb:.....

Ér jellege: (egyszerű választás) natív/ stentelt/ graftolt

PCI beavatkozás előtt:

Nyomásmérés nyugalomban:

Ritmus: Sinus ritmus/ arrhythmias

Pulzus (/min):

Proximalis RR: systolésHgmm, diastolés Hgmm , átlag Hgmm

Distalis RR: systolésHgmm, diastolés Hgmm , átlag Hgmm

Coronary Flow Reserve (CFR) mérés történt: igen/nem

Ha igen, értéke:.....

módszer: O thermodilutio

O Doppler

O Egyéb:.....

Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI 1-2-3) szerinti vérzés kritériumok

(egyszerű választás): O 1. major O 2. minor O 3. minimal

Nem-CABG kapcsolatos vérzés:

	Major	<ul style="list-style-type: none"> - Bármilyen intracranialis vérzés (kivéve microhemorrhagiákat <10 mm ami csak grádins-echo MRI-n ábrázolódik) - Klinikailag nyilvánvaló vérzés jelei, ami a hemoglobinnal ≥ 5 g/dL vagy $\geq 15\%$ abszolút csökkenéssel asszociált a hematokritban. - Fatális vérzés (olyan vérzés, ami halált eredményez 7 napon belül)
	Minor	<ul style="list-style-type: none"> - Klinikailag nyilvánvaló (képalkotót beleértve) 3 és <5 g/dL közötti hemoglobinesést vagy $\geq 10\%$ hematokrit csökkenést eredményez. - Nem észlelhető vérvesztés: ≥ 4 g/dL csökkenés a hemoglobinnal koncentrációban vagy $\geq 12\%$ csökkenés a hematokritban. - Bármilyen nyilvánvaló jele a vérzésnek, ami egyezik az egyik kritériummal az alábbiak közül és nem egyezik a fentebb részletezett major és minor vérzés eseménnyel. - Beavatkozást igénylő (szakorvos vagy sebész által vezérelt terápia felfüggesztés vagy vérzés kezelése, beleértve az ideiglenes vagy permanens abbahagyását vagy leváltását a vizsgált gyógyszeradagnak) - Elhúzóó kórházi ellátáshoz vezető - kiértékelés (nem tervezett visit a szakorvoshoz vagy diagnosztikus teszteléshez, akár laboros vagy képalkotó)
	Minima 1	<ul style="list-style-type: none"> - Bármilyen nyílt vérzés, ami nem felel meg a fentebb említett kritériumoknak - Bármilyen klinikailag vérzésre utaló jel (képalkotót beleértve) <3 g/dL asszociált hemoglobinnal koncentráció csökkenés vagy <9% hematocrit csökkenés

Coronary artery bypass graft (CABG) műtét közbeni vérzés (egyszerű választás)

(Kérem, csak akkor töltse ki, ha CABG beavatkozásra került sor)

Ha igen,

- Fatális vérzés (közvetlenül halálhoz vezető vérzés)
- Perioperatív intracranialis vérzés
- A sternotomia zárás utáni reoperáció vérzéscsillapítás céljából
- ≥ 5 U transzfúzió vörösvértest koncentrárum vagy teljes vér 48- órán belül; a sejtakarékos transzfúziót nem veszik figyelembe a vérkészítmények számításában.
- Mellkas drain output >2 L 24 órán belül

3.2. Proceduralis és/vagy kórházi szövődmény

(többszörös választás)

Arrhythmia

Ha igen, kérem jelölje a) pitvarfibrilláció b) karma fibrilláció c) asystolia d) egyéb:.....

Dissectio

Újraélesztés: ha igen, kamrai tachycardia / kamrafibrilláció miatt

Halál: igen/ nem

Ha igen, halál pontos ideje:..... (pl. 10.25 vagy 22.45, dátum:
év/hónap/nap)

Akut miokardiális infarktus (AMI)

Stroke

Ha igen, ischémia/ hemorrhagiás

Re-PCI

Sürgősségi CABG

Tamponád

Pericardiocentesis

Eszköz veszteség

Perforatio

Behatolási kapu szövődmény

Dissectio/ donor ér thrombus

Vérzés

Kontrasztanyag indukált nefropátia

Aortocoronaria dissectio

Bőr sugárégése

Egyéb, kérem jelölje:..... **(többszörösen legördülő)**

4. Multidiszciplináris team (Heart team) megbeszélés történt: igen/ nem

Ha igen, válassza ki a team tagjait (többszörös választás): intervenció kardiológus /

szívsebész / valve clinic koordinátor / szív katéteres labor és műtős személyzet /
aneszteziológus / referáló kardiológus / képalkotó specialista

Döntés (egyszerű választás): konzervatív terápia / sebészet / PCI stent implantatio

5. Kimenetel

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Halál | igen/nem (ha igen, több ne nyíljon le) |
| 2. FFR nyomásmérés történt | igen/nem |
| 3. Stent implantatio történt: | igen/nem |
| 4. CABG beavatkozásra került sor | igen/nem |
| 5. Re (ismételt) PCI történt | igen/nem |
| 6. Hazabocsájtották | igen/nem |
| 7. Kórházi felvétel történt | igen/nem (ha igen, nyíljon le) |

Ha igen, a) osztályra b) intenzív osztályra

Kórházi bent tartózkodás:.....nap(ok)